

Rappel

Le SIDA (*Syndrome d'immunodéficience acquise*) et l'Hépatite C font partie de la catégorie des virus. Les sources de transmission sont exclusivement le sang et les sécrétions sexuelles. Ni le SIDA ni l'Hépatite C ne se transmettent par voie aérienne.

SITUATIONS À RISQUES :

Dans le cadre d'interventions à domicile, deux situations de transmission de ces virus peuvent être envisagées :

1ÈRE SITUATION :

Par contact direct (*par la peau*) lorsque l'usager séropositif ou atteint d'une Hépatite C a une plaie et que l'intervenant en a une également (*même minuscule telle qu'une micro-coupure*).

2ÈME SITUATION :

En se piquant accidentellement avec une seringue qui a préalablement été utilisée sur l'usager séropositif ou atteint d'une Hépatite C.

**CONSEILS**

1 / Dans tous les cas, même si vous n'avez pas d'information sur l'affection ou non de votre bénéficiaire par l'un des deux virus, des précautions sont à prendre si vous vous trouvez dans l'une des deux situations exposées précédemment. En effet, **un usager (ni même un tiers) n'a pas l'obligation légale de nous informer sur son état de santé.**

2 / Si vous vous trouvez dans la situation n°1, un usager a une plaie ouverte. S'il s'agit d'un soin élémentaire (poser un pansement), vous pouvez le réaliser à la condition exclusive que vous disposiez d'une paire de gants qui vous permette d'éviter tout risque de contamination. En effet, vous pouvez avoir une micro-coupure que vous ignorez. **Si vous n'avez pas de gant à disposition, vous devez refuser tout soin même anodin** tel que la pose d'un pansement par exemple.

3 / Si vous vous trouvez dans la situation n°2, vous trouvez au domicile de votre bénéficiaire une seringue usagée. Afin de sécuriser l'usager lui-même ou d'autres tiers pouvant se trouver au domicile, **mettez la seringue à l'écart le temps que l'infirmière vienne la récupérer sans essayer de la recapuchonner.**